



Drontal®

Droncit®

Welpan®



**EROON MADOISTA KERTAHEITOLLA
– LÄÄKKEET KISSAN JA KOIRAN
SISÄLOISIA VASTAAN**



Bayer HealthCare
Animal Health

ORION
PHARMA

HYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

Pidä huolta lemmikistäsi – hoida pois kiusalliset loiset

Loistartunta on usein täysin oireeton, varsinkin aikuisella eläimellä. Loiset on hyvä hoitaa pois, sillä oireettomanakin ne heikentävät eläimen yleiskuntoa. Eläinlääkäri voi tarkistaa loistilanteen esimerkiksi eläimen ulostenäytteestä.

E erityisen tärkeää on huolehtia pentujen, nuorten eläinten sekä astutettavien ja kantavien narttujen sisäloishäädöstä. Myös metsästävien sekä näyttelyissä tai kilpailuissa käyvien lemmikkien säännöllinen loishäätö on tarpeen.

Loisten häätö on helppoa, sillä **kerta-annos Drontalia, Droncicia ja Welpania riittää.**





Suolinkainen



Heisimato



Heisimadon jaokkeita



Piiskamatoja



Hakamatoja



Ekinokokkeja

Koiran yleisimmät suolistoloiset

- Suolinkainen
- Hakamato
- Piiskamato
- Heisimato
 - Dipylidium caninum
 - Taenia-lajit
 - Ekinokokki
 - Leveä heisimato eli lapamato

Kissan yleisimmät suolistoloiset

- Suolinkainen
- Heisimato
 - Dipylidium caninum
 - Taenia taeniaformis
 - Leveä heisimato eli lapamato

Loistartunnan oireita ovat muun muassa:

- Ulosteeissa tai peräaukon ympärillä näkyvät riisinyvämäiset tai spagettimaiset loisen jaokkeet
- Kuiva, kiilloton ja takkuinen turkki
- Yskä ja selittämättömät tulehdukset
- Ripuli, laihtuminen
- Epämääräinen oksentelu
- Pömppömahaisuus ja suuri ruokahalu

Milloin on sisäloishäädön aika?

Yleisohje: 1-2 kertaa vuodessa tai aina, kun loisia on todettu sekä ennen rokotusta.

Pennut: 2, 4, 6, 8 ja 12 viikon iässä ja sen jälkeen tarpeen mukaan.

Nartut: Ennen astutusta, noin 42. tiineyspäivänä (ei Drontal®) ja samaan aikaan pentujen kanssa tai eläinlääkärin antaman ohjeen mukaan.

Sisäloiset saattavat heikentää rokotteen tehoa, joten on suositeltavaa häätää ne noin kaksi viikkoa ennen rokotuksia.

Lääkkeet sisäloisten karkotukseen

Valmiste	Käyttöaihe	Annostus	Vasta-aihe
Drontal® comp.			
Febanteeli 150 mg Pyranteeliembonaatti 144 mg Pratsikvanteli 50 mg Pakkauskoost: 2 ja 24 tablettia	Koirien pyörö- ja heisimatojen häätö.	1 tabletti/10 kg. Painon mukainen annos annetaan kerta-annoksena. MAUSTETTU LIHA-AROMILLA!	Ei suositella nartuille tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana.
Drontal® comp. Forte			
Febanteeli 525 mg Pyranteeliembonaatti 504 mg Pratsikvanteli 175 mg Pakkauskoost: 2 ja 10 tablettia	Koirien pyörö- ja heisimatojen häätö. Suurille koirille.	1 tabletti/35 kg. Painon mukainen annos annetaan kerta-annoksena.	Ei suositella nartuille tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana.
Drontal®			
Pyranteeliembonaatti 230 mg Pratsikvanteli 20 mg Pakkauskoost: 2 ja 20 tablettia	Kissojen pyörö- ja heisimatojen häätö.	1 tabletti/4 kg. Painon mukainen annos annetaan kerta-annoksena.	Ei suositella tiineille kissoille.
Droncit®			
Pratsikvanteli 50 mg Pakkauskoost: 2 ja 20 tablettia	Koirien ja kissojen heisimatojen häätö.	Heisimadot: 5 mg/kg = 1/2 tablettia/5 kg, 1 tabletti/10 kg. Leveä heisimato: 40 mg/kg (8 x normaaliannos) = 4 tablettia/5 kg, 8 tablettia/10 kg. Painon mukainen annos annetaan kerta-annoksena.	Käytölle ei ole vasta-aiheita.
Welpan®			
Febanteeli 15 mg Pyranteeli 5 mg Pakkauskoost: 50 ml oraalisuspensio	Koiranpentujen ja enintään vuoden ikäisten koirien pyörömatojen häätö.	1 ml suspensiota/1 kg suun kautta. Painon mukainen annos annetaan kerta-annoksena.	Ei saa käyttää tiineyden tai imetyksen aikana. Ei saa käyttää samanaikaisesti piperatsiinia sisältävien yhdisteiden kanssa.



Miten loiset leviävät?

Pennut voivat saada ensimmäisen loistartunnan jo emon kohdussa. Aikuiset eläimet saavat tartunnan esimerkiksi syömällä maastaa tai turkistaan loisten munia. Jyrsijöistä tai pienriistasta voi saada heisimadon, hirvistä ekinokokin ja raaosta järvikaloista lapamadon eli leveän heisimadon.

Myös sisäkissoilla saattaa olla loisia, sillä ne voivat levitä esimerkiksi ihmisen kengänpohjien mukana. Varsinkin ulkomailla eläimet voivat saada muitakin sisäloisia, jotka on syytä häätää juuri ennen kotimaahan saapumista.



Ympäristön puhtaana-pito auttaa loishäädössä

Loislääkityksen tarve on säännöllinen, sillä lääkitys hävittää vain eläimessä sillä hetkellä olevat loiset. Mikäli matoja on todettu, on uusi tartunta ennaltaehkäistävä. Uusien tartuntojen ehkäisy tapahtuu parhaiten huolehtimalla ympäristön puhtaudesta. Eläinten ulosteet kerätään teiden varsilta ja pihoilta. Kissanhiekkä vaihdetaan ja laatikko puhdistetaan, samoin makuualustat vaihdetaan tai pestään huolellisesti. Hygienian ylläpito on tärkeää, sillä loisten munat voivat olla tartuntakykyisiä vielä usean vuoden kuluttua.

Drontal[®], Droncit[®] ja Welpan[®]-lääkkeet tehoavat yleisimpiin sisäloisiin.



**Kätevät, kerta-annettavat tabletit tehoavat
kaikkiin yleisimpiin sisäloisiin.**

Drontal® comp. Forte, isojen koirien tabletti

Drontal® comp., hyvänmakuinen tabletti koirille

Welpan®, nestemäinen kerta-annos pennuille pyörömatojen häätöön

Drontal® comp. vet. tabl.

Febanteeli 150 mg. Pyranteeliembonaatti 144 mg. Pratsikvanteli 50 mg. Pakkauskoot: 2 ja 24 tabl.

Käyttö: Koirien pyörö- ja heisimatojen häätö.

Ei suositella nartuille tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Annostus: 1 tabl./10 kg.

Drontal® comp. Forte vet. tabl.

Febanteeli 525 mg. Pyranteeliembonaatti 504 mg. Pratsikvanteli 175 mg. Pakkauskoot: 2 ja 10 tabl.

Käyttö: Koirien pyörö- ja heisimatojen häätö.

Ei suositella nartuille tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Annostus: 1 tabl./35 kg.

Drontal® vet. tabl.

Pyranteeliembonaatti 230 mg. Pratsikvanteli 20 mg. Pakkauskoot: 2 ja 20 tabl.

Käyttö: Kissojen pyörö- ja heisimatojen häätö. Ei tiineille kissoille. Annostus: 1 tabl./4 kg.

Droncit® vet. tabl.

Pratsikvanteli 50 mg. Pakkauskoot: 2 ja 20 tabl. Käyttö: Koirien ja kissojen heisimatojen häätö.

Ei tiineille kissoille. Annostus: Heisimadot: 5 mg/kg= 1/2 tablettia/5 kg, 1 tabletti/10 kg.

Leveä heisimato eli lapamato: 40 mg/kg= 4 tablettia/5 kg, 8 tablettia/10 kg.

Welpan® vet. oraalisuspensio

Febanteeli 15 mg/ml, pyranteeli 5 mg/ml. Pakkauskoko: 50 ml oraalisuspensio.

Käyttö: Koiranpentujen ja enintään vuoden ikäisten koirien pyörömatojen häätöön.

Ei saa käyttää tiineyden tai imetyksen aikana. Ei saa käyttää samanaikaisesti piperatsiinia sisältävien yhdisteiden kanssa. Annostus: 1 ml/kg.

Lue pakkausselosteet huolellisesti ennen lääkintää.

Myyntiluvan haltija: Bayer Animal Health GmbH, Leverkusen, Saksa



Bayer HealthCare
Animal Health



HYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET
PL 425, 20101 Turku, puh. 010 4261, faksi 010 426 7771, www.drontal.fi